

جبریکس



سفارشات برائے استعمال

فصل	وقت استعمال	طریقہ استعمال	مقدار فی 100 لیٹر پانی
کھیرا	پہلا اسپرے پھول آنے سے پہلے دوسرا اسپرے پھول آنے کے بعد 14 دن کے وقفے سے چار اسپرے	اسپرے	10 گرام
مرچ	پھول آنے کے بعد سات دن کے وقفے سے دو اسپرے (پھل توڑنے سے پہلے)	اسپرے	10 گرام
اسٹرا بھری	پھل آنے کے 10-15 دن بعد	اسپرے	30 گرام
انگور	پھلوں کا سائز بڑھانے کیلئے جب پھلوں کی پائی 2-5 انچ ہو پھل کا سائز بڑھانے کیلئے جب پھل کا سائز 3-5 لی میٹرو	اسپرے	25 گرام 80 گرام 50 گرام
سیب	پھل کے کیرے کم کرنے کیلئے پھل توڑنے سے 15-30 دن پہلے اسپرے کریں	اسپرے	50 گرام
نارنگ	پھول آنے کے بعد	اسپرے	25 گرام فی 100 لیٹر پانی

- ابتدائی نشوونما میں بہتری۔ بروقت، جلدی اور زیادہ پیداوار
- بہتر پھل پوری (Pollination)۔ پھل کی تعداد میں اضافہ
- پھل کی جسامت میں اضافہ۔ وزنی پھل، زیادہ پیداوار
- بیج کی خوابیدگی (Dormancy) توڑنے کے لئے اہم جلدی اور بہتر اگاؤ